Hustong Pagpili ug Pag-andam sa Lugar nga Semilyahan

[Pag establisar sa Tanum]

Unsaon ang pagpili sa Lugar nga Semilyahan:

1. Ang sakto nga lugar para semilyahan kinahanglan:
- Duol sa tinubdan para mapasayon ang pagpatubig
- Halayo sa sugang dagitab nga maoy makapadani sa mga insekto sama sa *stem borer*, berdeng bunhok(*green leafhopper)*, ug kapeng bunhok(*brown planthopper)*
- Halayo sa mga subing nga mamahimong gigikan sa mga pesting insekto ug mga sakit.
- Halayo sa landong sa mga tag-as nga tanum sama sa kahoy aron mahatagan sa insaktong kahayag alang sa himsog nga pagtubo ug pagdako sa semilya.

Ganihan ug 40 sentimetro nga lat-ang matag semilyahan aron mapasayon ang pag-atimani.

2. Paggahin ug 500-600 metro kwadrado nga luna (diin ang 400 metro kwadrado alang sa pinaugdo nga semilyahan ug ang 100-200 metro kwadrado alang sa gagmay'ng kanal sa matag ektarya nga luna nga talamnan.

Ang kinatibuk-ang gidak-on sa semilyahan matag ektarya mokabat sa 500-600 ka metro kwadrado (diin ang 400 metro kwadrado alang sa pinabundo nga saburanan ug 100-200 ka metro kwadrado alang sa mga gagmay'ng kanal nga nagpalibot sa matag saburan).

Pag-andam sa Semilyahan

1. Palabyan ug tubig ang semilyahan adeser darohon aron mapaturok ang mga liso sa sagbot u gang mga tagak nga kugas sa humay sa niaging tingtanum.
2. Daruhon ang luna sa semilyahan, palapawan ug tubig sulod sa usa ka semana
3. Karason o sudlayon sa 3 ka higayon ang yuta o hangtod sa makab-ot ang ensakto nga pagkalapok sa yuta
4. Usa ka adlaw sa dili pa isabwag ang semilya, ipabundo ang semilyahan ngadto sa 4-5 sentimetro ang gihabugon pinaagi sa pagkalot sa yuta sa palibot niini.

- Ang semilyahan kinahanglan 1ka metro ang kalapdon ug bisan unsa nga gusto nga katas-on.
- Ang kinatibuk-ang luna sa semilyahan nanginahanglan ug 400 metro kwadrado sa matag ektarya nga talamnan.
- Gahinan ug 40 ka sentimetro nga lat-ang sa matag semilyahan aron sayon ang pagdumala sa niini.

PHILRICE

Fair use of this material is encouraged. Proper citation is requested. | © 2010 PhilRice

5. Kung mahimo, magbutang ug 10-15 ka sako nga organikong materyales matag 400 metro kwadrado nga semilyahan (pwede ang inuling nga tipaka sa humay, serin, kinuhaan sa lanot sa bunot o “coir dust”) aron humok o bukagay ang yuta sa semilyahan. Isagol ang organikong materyales ibabaw sa semilyahan ug patagon kini sa dili pa isabwag ang binhi. Kani makatabang nga mapasayon ang pagganit sa semilya ug malikayan ang pagkapugtod sa gamut sa panahon sa pag-ibot.

Reviewed by:
Rolando C. San Gabriel

Translated by: